

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:

при малейшем подозрении на развитие кори следует незамедлительно обратиться к врачу;

больной изолируется на весь заразный период (до 4-го дня высыпаний);

больной должен соблюдать постельный режим;

дать обильное питье;

выполнять назначения врача;

ежедневно проводить профилактический осмотр и термометрию лиц, которые находились в контакте с больным.

В случае развития осложнений кори дальнейшее лечение проводят в стационаре.

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

Надежным и эффективным методом профилактики кори является **ВАКЦИНАЦИЯ.**

Первую вакцинацию проводят детям в возрасте 12 месяцев, вторую - в возрасте 6 лет.

Прививка обеспечивает стойкий защитный эффект в течение 15 лет.

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь



Министерство здравоохранения Республики Беларусь рекомендует пройти двукратную вакцинацию до поездки в страны, неблагополучные по заболеваемости корью, следующим категориям лиц:

не болевшим корью;

не привитым против кори;

имеющим одну прививку.

ГУ «Витебский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья»

210015 г.Витебск, ул.Ленина, 20

Тел/факс: 8 (0212) 37 02 95

Текст подготовила А.Кудлюк

Редактор Е.Каер

Оформление: А.Кудлюк

ГУ «Витебский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного
здоровья»

Профилактика кори



2012 г.

КОРЬ - широко распространенное острое инфекционное заболевание.

Корь является одной из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день.

Корью болеют только люди. Ранее корь считалась исключительно детской инфекцией, в последние годы наблюдается рост числа заболевших среди подростков и взрослых.

Путь передачи инфекции - воздушно-капельный.

СИМПТОМЫ КОРИ.

Время от заражения до появления первых симптомов длится от 7 до 14 дней. Болезнь начинается с симптомов простуды:



температура 38-40 градусов, резкая слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз).

Через 2-4 дня после первых симп-

томов болезни **на слизистой оболочке щек (напротив коренных зубов) возникают мелкие беловатые высыпания.**



На 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен, которые име-

ют тенденцию сливаться между собой.

Сначала она обнаруживается **за ушами и на лбу,** затем быстро распространяется

на лицо, шею, тело и конечности.

Мелкие розовые пятна сыпи быстро увеличиваются в размерах, приобретают неправильную форму, иногда сливаются.



Сыпь держится 4-7 дней. На месте пятен остаются очаги коричневой пигментации, через 2 недели кожа становится чистой.

В период максимального высыпания, через 2-3 дня после появления сыпи, температура снова может подниматься до 40,5°.

Осложнения:

- ♦ воспаление среднего уха (отит),
- ♦ слепота,
- ♦ бронхопневмония,
- ♦ воспаление шейных лимфоузлов,
- ♦ ларингит,



- ♦ энцефалит,
- ♦ пневмонии (воспаления бронхов и легких),
- ♦ тяжелая диарея (понос),
- ♦ нарушения питания.